


Koronavaksine for barn 5-11 år

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19




Koronasykdom

Koronavirus er svært sjelden farlig for barn.

Noen barn kan likevel ha nytte av vaksine.

Det å ha korona beskytter minst like godt som vaksinen mot ny sykdom.



Om vaksineringsen


Hvis du og dine foreldre/foresatte ønsker, kan du få 1 eller 2 doser koronavaksine.

Det er frivillig å ta vaksine.

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen.

Si fra hvis du er redd for sprøyter så den som vaksinerer kan passe ekstra på deg.

Hvis dere velger 2 doser, bør det være 8-12 uker mellom dosene.



Hvor godt virker vaksinen?

Barn får god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom 3 uker etter 1. dose.

Du kan bli smittet og smitte andre selv om du har fått vaksine.


Følg koronareglene selv om du har fått vaksine.



Hvordan virker vaksinen?

Vaksinen lærer kroppen å kjenne igjen koronaviruset og å beskytte deg.

Kroppen husker hvordan den kan forsvare deg mot viruset.



Vanlige bivirkninger

Du kan få noen plager etter vaksinen. Det kalles bivirkninger. De vanligste er:

- Vondt på stikkstedet
- Trøtthet
- Vondt i hodet
- Vondt i kroppen
- Frysninger og feber

Dette bruker å gå over etter få dager.



Uvanlige bivirkninger

Alvorlige bivirkninger er svært sjelden.

Sjeldne bivirkninger som allergiske reaksjoner og hjertebetennelse kan behandles hvis de oppstår.

Vi følger nøye med på om det skulle oppstå nye bivirkninger.

Kontakt lege, helsesykepleier eller annet helsepersonell hvis barnet får uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.



[Last ned samtykkeskjema her](#)

Foreldre/foresatte må godkjenne (samtykke til) vaksinasjon av barn 5-11 år. Vaksinerings er gratis. Sjekk nettsidene til kommunen din for hvordan du kan få time. Les mer på fhi.no/kvp